

IAPAR 61

Avoine rude

L'essentiel

*Vigoureuse
et productive*

*Bonne
valorisation
fourragère*

*Résistante
et saine*



caussadesemences

IAPAR 61

Avoine rude



Profil variétal

Famille : Poacées (graminées)

Espèce : *Avena strigosa*

Type variétal : diploïde tardive

Vitesse d'implantation : élevée

Couverture de sol : bonne

Port de plante : dressé

Système racinaire : fasciculé

Rapport C/N : élevé (25-30)

Part d'N minéralisée : 24%



L'essentiel

Vigoureuse et productive

- IAPAR 61 apporte une amélioration significative en termes de vitesse d'implantation et de production de matière organique. Plus tardive, elle s'affranchit du risque de montée à graine, même en cas de semis précoces.

Résistante et saine

- IAPAR 61 est adaptée à tous les types de sols et de rotations. Son effet allélopathique, biocide (rouilles, fusarium,...) et sa résistance aux ravageurs (pucerons, nématodes) en font une espèce dédiée à la rupture des cycles.

Conseils

Destruction

- Exportation : valorisation fourragère ou énergétique (méthanisation)
- Détruire au moins 2 mois avant la culture suivante
- Gel : 7°C au stade floraison
- Chimique

Restitutions potentielles

Pour un couvert à (t/MS/ha)

	3	4	5
N	10	15	20
P	10	15	20
K	90	120	150

Méthode MERCI

Bonne valorisation fourragère

- Le fourrage produit présente de très bonnes valeurs alimentaires (digestibilité, UF, MAT et appétence). Son association aisée avec une légumineuse sera bénéfique à sa teneur en protéines.

Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert



Soja



Tournesol



Betterave



Légumes

Conseils de culture

- Le semis à la volée reste possible en conditions favorables.
- Rouler derrière le semis favorise une meilleure levée.
- Facilement associable.

Semis

- Densité : 25 à 35 kg/ha à 2-3 cm de profondeur
- PMG : +/- 16 g
- Pieds/m²: 150 à 200 plantes à 30 kg/ha
- Dates de semis optimales :



- 15/07 - 01/09
- 15/07 - 05/09
- 15/08 - 15/09
- 15/08 - 30/09



caussadesemences